

Caractéristiques des séjours

Caractéristiques des séjours liés à une tentative de suicide en Bretagne entre 2009 et 2021

Bretagne
2009 à 2021

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre d'hospitalisations en court séjour, domiciliées en Bretagne, liées à une tentative de suicide	7 472	7 642	7 119	7 091	6 658	6 717	6 314	5 989	6 277	6 508	5 831	5 586	5 958
Nombre moyen de séjours quotidiens	20,5	20,9	19,5	19,4	18,2	18,4	17,3	16,4	17,2	17,8	16,0	15,3	16,3
Part de ces séjours parmi l'ensemble des hospitalisations*	1,0%	1,0%	0,9%	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,7%	0,6%	0,5%

* Domiciliées en Bretagne - Hors séances et séjours de moins de 2 jours.
Source : PMSI MCO 2009 à 2021, ATIH

Exploitation ORS Bretagne.

Caractéristiques des patients

Caractéristiques des patients hospitalisés en court séjour pour tentative de suicide en Bretagne entre 2011 et 2021

Bretagne
2011 à 2021

	2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%	Nb	%
Nombre total de patients pris en charge	6 025	100%	5 986	100%	5 679	100%	5 644	100%	5 297	100%	5 012	100%	5 254	100%	5 449	100%	4 973	100%	4 804	100%	5 022	100%
% de patients hospitalisés une seule fois au cours de l'année	5 271	87,5%	5 257	87,8%	4 974	87,6%	4 916	87,1%	4 636	87,5%	4 390	87,6%	4 587	87,3%	4 761	87,4%	4 381	88,1%	4 245	88,4%	4 381	87,2%
% de patients hospitalisés plusieurs fois au cours de l'année	754	12,5%	729	12,2%	705	12,4%	728	12,9%	661	12,5%	622	12,4%	667	12,7%	688	12,6%	592	11,9%	559	11,6%	641	12,8%
% de patients hospitalisés à la fois année n et n-1*	420	8,0%	388	7,4%	374	7,5%	352	7,2%	337	7,3%	298	6,8%	325	7,1%	317	6,7%	356	8,1%	349	8,2%	311	7,1%
Répartition selon le sexe*																						
Part des hommes	2 066	39,2%	2 020	38,4%	2 013	40,5%	1 952	39,7%	1 883	40,6%	1 772	40,4%	1 913	41,7%	1 966	41,3%	1 797	41,0%	1 743	41,1%	1 697	38,7%
Part des femmes	3 205	60,8%	3 237	61,6%	2 961	59,5%	2 964	60,3%	2 753	59,4%	2 618	59,6%	2 674	58,3%	2 795	58,7%	2 584	59,0%	2 502	58,9%	2 684	61,3%
Âge moyen * (en années)	40,7		41,2		41,7		41,5		42,1		41,4		41,4		41,6		42,2		42,3		40,8	

Source : PMSI MCO 2011 à 2021, ATIH

*Les données présentées concernent les caractéristiques des patients n'ayant été hospitalisés qu'une seule fois au cours de l'année, dans le contexte d'une tentative de suicide, afin que les résultats ne contiennent pas de « doublons ».

Exploitation ORS Bretagne.

Taux standardisés de recours à l'hospitalisation en court séjour

Taux standardisés* de recours à l'hospitalisation en court séjour pour tentative de suicide selon le sexe et les départements de résidence entre 2009 et 2021 (unité pour 100 000)

Sexe
Département
Bretagne
2009 à 2021

HOMMES	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Côtes d'Armor	167	180	176	175	193	165	159	145	156	162	176	145	167
Finistère	161	153	143	136	131	136	129	119	126	128	128	131	111
Ille-et-Vilaine	118	121	110	108	104	104	100	92	109	113	76	81	74
Morbihan	125	147	129	129	119	120	118	120	121	121	120	112	110
Bretagne	140	146	135	132	130	126	122	114	124	127	116	112	107

Source : PMSI MCO 2009 à 2021, ATIH, INSEE 2009 à 2021.

*Standardisation sur la population française au RP 2006.

Exploitation ORS Bretagne.

FEMMES	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Côtes d'Armor	245	269	260	269	262	228	211	208	214	229	216	212	229
Finistère	236	229	200	213	194	201	179	180	184	175	183	169	180
Ille-et-Vilaine	185	187	176	169	151	155	150	135	132	150	114	111	112
Morbihan	218	217	214	198	176	183	168	159	154	169	158	155	176
Bretagne	216	219	206	205	187	186	172	164	165	174	159	152	164

Source : PMSI MCO 2009 à 2021, ATIH, INSEE 2009 à 2021.

*Standardisation sur la population française au RP 2006.

Exploitation ORS Bretagne.

ENSEMBLE	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Côtes d'Armor	205	224	217	222	227	196	185	176	184	195	196	178	196
Finistère	198	190	171	174	162	168	153	149	154	151	155	150	145
Ille-et-Vilaine	152	154	143	139	128	130	125	114	121	131	95	96	92
Morbihan	170	181	171	163	147	151	142	138	137	144	138	133	142
Bretagne	178	182	170	168	158	156	147	139	144	150	137	132	135

Source : PMSI MCO 2009 à 2021, ATIH, INSEE 2009 à 2021.

*Standardisation sur la population française au RP 2006.

Exploitation ORS Bretagne.

Taux spécifiques de recours à l'hospitalisation en court séjour

Âge
Sexe
Bretagne
France
2021

Taux bruts de recours à l'hospitalisation en court séjour pour tentative de suicide selon l'âge et le sexe en Bretagne et en France en 2021 (unité pour 100 000)

TRANCHES D'ÂGE	Bretagne			France hexagonale		
	Hommes	Femmes	Ensemble	Hommes	Femmes	Ensemble
5-14 ans	13,5	123,9	67,3	17,8	113,4	64,5
15-24 ans	138,4	387,5	258,6	112,7	305,2	206,5
25-34 ans	150,7	145,7	148,2	107,6	108,4	108,0
35-44 ans	165,3	158,6	161,9	110,1	107,1	108,5
45-54 ans	155,3	189,8	172,5	107,6	140,9	124,4
55-64 ans	102,4	159,1	131,3	73,8	99,6	87,2
65-74 ans	53,3	86,8	71,1	44,8	63,6	54,8
75-84 ans	77,6	70,6	73,6	49,2	65,9	58,7
85 ans et +	103,3	53,3	68,6	78,3	62,6	67,6
Total	108,5	161,4	135,8	80,5	124,6	103,3

Source : PMSI MCO 2021, ATIH, INSEE - population au 01/01/2021.

Exploitation ORS Bretagne.

Taux spécifiques de recours à l'hospitalisation en court séjour

Âge
Département
2021

Taux bruts de recours à l'hospitalisation en court séjour pour tentative de suicide selon l'âge et le département de résidence en 2021 - Deux sexes confondus (unité pour 100 000)

TRANCHES D'ÂGE	Côtes d'Armor	Finistère	Ille-et-Vilaine	Morbihan
5-14 ans	63,7	62,1	28,0	52,2
15-24 ans	389,7	273,1	188,9	265,3
25-34 ans	216,4	175,0	93,2	167,2
35-44 ans	259,3	157,3	105,3	186,6
45-54 ans	258,6	187,9	108,0	179,1
55-64 ans	161,7	139,4	97,7	138,1
65-74 ans	104,2	74,3	51,1	61,2
75-84 ans	91,0	71,5	68,8	66,6
85 ans et +	82,8	55,4	80,3	59,3

Source : PMSI MCO 2021, ATIH, INSEE - population au 01/01/2021.

Exploitation ORS Bretagne.

LES SOURCES DE DONNÉES

Les données de population utilisées sont issues des recensements de la population (RP) et des estimations de population au 1^{er} janvier de chaque année réalisées par l'Insee.

Les données de morbidité hospitalière sont issues de l'exploitation des bases du Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information (PMSI) des services de Médecine Chirurgie Obstétrique (MCO) diffusées par l'Agence Technique de l'Information sur l'Hospitalisation (ATIH). Ces bases regroupent les séjours des établissements publics, privés lucratifs et non lucratifs. La dernière année disponible actuellement se réfère à l'année 2021.

Depuis 2001, les prises en charge pour tentative de suicide peuvent être identifiées par les codes du chapitre XX de la Classification Internationale des Maladies (CIM 10) relatifs aux causes externes de morbidité et de mortalité en diagnostic associé significatif (DAS). En théorie selon les règles et consignes de codage définies par l'ATIH, les séjours pour tentative de suicide doivent mentionner en DAS un code X60 à X69 (auto-intoxication) ou X70 à X84 (lésion auto-infligée), ainsi qu'un diagnostic principal (DP) codé avec le chapitre XIX « Lésions traumatiques, empoisonnements et certaines autres conséquences de causes externes » (code S00 à T98).

Cependant, compte tenu des imprécisions relevées au niveau du codage, tous les séjours contenant en DAS un code X60 à X84 sont retenus pour l'analyse, quel que soit le code mentionné en DP. Par ailleurs, seuls les séjours domiciliés en Bretagne de personnes âgées de plus de 5 ans sont pris en compte (quel que soit le lieu d'hospitalisation).

Afin de caractériser les patients concernés par une hospitalisation pour tentative de suicide, la procédure dite du « chaînage » des séjours a été appliquée pour la Bretagne afin de relier les différents séjours d'une même personne hospitalisée grâce à un numéro anonyme unique. Les taux sont donc calculés sur la base du nombre de patients, sauf pour les données qui présentent la position de la Bretagne par rapport à la France où les taux sont calculés sur la base du nombre de séjours.

Ont été retenus, les séjours des patients n'ayant été hospitalisés qu'une seule fois au cours de l'année, dans le contexte d'une tentative de suicide, afin que les résultats ne contiennent pas de « doublons » (c'est-à-dire qu'une même personne ne soit pas comptée deux fois ou plus).